



Galotta



OMTP1747



INRA
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier

OMtp1747

Vass2R06s591-595

*2R06s591-595
Galotta*

3484


OMtp1747


Galotta


Vass2R06s591-595

*LP
15.07 (x5)*









Galotta



OMTP1747 - bis



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s596-600
OMtp1747

2R6 s 596-600
Galotta


O. 1747




GALOTTA

2R6 s 596-600

LP x 5

29.07.13







10/03/08

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2008 3484
Code cépage : 0-1747 Code introduction :
Nom introduction : Galotta
Observateur :
Emplacement : 2R6 0591-600
2R6 0591 595

Phénologie

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 époque de floraison (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base) : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 vigueur rameaux (floraison) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité) : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 (Asaucta information - bourgeons) | | 20/3 | 6 | |
| 2 | 3 autres yeux mûres ou débourrés | | 17/3 | 9 | |
| 3 | 4 en formation circa 22/3 | 25/3 (24/3 + 25/3) | 28/3 (30/3) | 8 | |
| 4 | 2 | 18/3 | 25/3 | 6 | |
| 5 | 6 | 17/3 24/3 | 20/3 | 12 | |
| Moyenne | 17 | | 22/3 | 41 | 24 |

+12

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 19/5 | 27/5 | | 17 107 | 21/107 | 28/8 | |

pas tout fait NF le 23/5
+3

+1

+2

qq. Fleurs sans en états cause Embaum
-a 16/05

IR 176 2108
12 : 21. 22 123/9.

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

3484

Observateur :

Emplacement : Vass2R06s596-600

Nom introduction : Galotta

oiv 301 époque du bourgeonnement (50%) : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance *Botrytis* grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

| Souche | Nombre de bourgeons | Date de début | débourrement moitié (oiv 301) | Nbre grappes (oiv 153) | Fertilité (grappes/10 yeux) |
|---------|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| 1 | 5 | 17/3 | 20/3 | 12 | |
| 2 | 2 | | 17/3 | 6 | |
| 3 | 3 | 17/3 | 20/3 | 10 | |
| 4 | 5 | 17/3 | 20/3 | 8 | |
| 5 | 4 | 17/3 | 20/3 | 13 | |
| Moyenne | 19 | | 19/3 | 49 | 29 |

+ 9

| Date de début | floraison moitié (oiv 302) | Taux de nouaison % (oiv 501) | Date de début | véraison moitié (oiv 303) | Date de maturité (oiv 304) | Début aoûtement (oiv 306) |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 19/5 | 27/5 ₊₃ | | 17/07 | 24/07 | 13/08 | |

pas tout à fait M.F. le 23/5
après pluie s'ouvrent en étoile cause. Emboum 16/5
et Feuille A jaunissent.